

LANGUR DE JAVA

[*Trachypitecus auratus*]

Classe : **Mammifères**

Ordre : **Primates**

Famille : **Cercopithecidae**

Statut de protection :

Cites : Annexe I

Règlement communautaire : Annexe A



Description physique

| Longueur : 44 à 65 cm (queue : de 61 à 87 cm) | Poids : 7 kg

Le langur de Java a un pelage brillant noir avec du brun sur les jambes et le ventre. Parfois, certains individus ont un pelage orange. La différence de couleurs n'est pas encore expliquée par les scientifiques. Les bébés langurs de Java ont tous un pelage orange à la naissance. Ils changent de couleur au fur à mesure qu'ils grandissent.

Comme tous les langurs, cette espèce dispose d'une queue assez longue, par rapport au corps. Ils possèdent un estomac à plusieurs sacs indispensables pour digérer la cellulose et assurer une bonne fermentation.

Comportement

Les langurs de Java sont arboricoles et diurnes.

Ils utilisent des cris d'alarme qui sonnent comme «ghek-ghok-ghok-ghok». Ils communiquent également par des signaux visuels et par le toucher. Les langurs ont peu de prédateur car ils sont très agiles, les petits peuvent être menacés par des petits carnivores (civette notamment) ou des félins lorsqu'ils ne sont pas au sein du groupe.

Reproduction

Les groupes sont formés d'un ou deux mâles matures. Les naissances peuvent survenir tout au long de l'année. Les bébés se développent rapidement et sont souvent indépendants au bout de leur première année de vie. Toutes les femelles du groupe apportent des soins aux jeunes mais seule la mère l'allait.

Conservation

Considéré comme vulnérable par l'IUCN depuis 2008. On observe un déclin de 30% sur les trois dernières générations principalement à cause de la déforestation, la capture pour le commerce illégal, et la chasse « indigène ». Le gouvernement indonésien attaché au respect de sa faune a interdit le commerce de viande de brousse (viande d'animaux sauvages).



Javan Langur

Lifestyle

There are different ways that langurs organise their groups, which are called troops. They live in groups of 1 or 2 adult males and several females and young. Langur troops make loud calls to let other troops know where they are. Troops generally travel slowly through the treetops, feeding as they go. Langurs help the forests in which they live by spreading seeds from one part to another as they travel.

Diet

His food is difficult to digest and does not have a high nutrition value, so langurs are not as active as some other kinds of monkey. Langurs have large stomachs that have several sections. This is because plant cells are surrounded by tough material called cellulose, which is very difficult to digest without special bacteria, which is found in the first section of the langur's stomach.

Conservation

The natural population of the Javan Langur Monkey is in decline. This endangered species is struggling to survive amidst deforestation, poaching and illegal trade of these animals. This sanctuary takes in Javan langurs that have been rescued or confiscated. Once at the sanctuary, the monkeys are then put through a rehabilitation program which includes the introduction of natural food, socialization, a medical and psychological check-up and recovery. This is to hopefully enable them to be released back into the wild.



**Forêts primaires
de Java, Bali
et Lombok**



**FOLIVORE
se nourrissant
de feuilles, d'herbe,
de fruits et de fleurs**



**Gestation : 210 jours
Nbre de petits
par portée : 1
Maturité sexuelle : 3/4 ans
Longévité : 20 ans**



< VULNERABLE >

VULNÉRABLE
VU