

LE LORIS LENT PYGMÉE

[*Nycticebus pygmaeus*]



Classe : **Mammifères**

Ordre : **Primates**

Famille : **Lorisidae**



Convention de Washington



Description physique

| Poids : 350 et 600 gr |

Le loris est un prosimien, c'est-à-dire un primate mais pas un singe.

Il a une fourrure fine marron orangée.

Le pelage des petits diffère de celui des adultes. Il va être plus long et va leur donner une apparence duveteuse similaire à celle de fruits et fleurs de la forêt équatoriale.

Comportement

Dans la nature, ont été observés uniquement des individus isolés.

Ils sont arboricoles et actifs la nuit. Le jour ils dorment dans les branches et des touffes de branches.

Ils marchent lentement et peuvent bouger rapidement quand c'est nécessaire, notamment quand ils attrapent leurs proies.

Ils communiquent grâce à l'olfaction et utilisent l'urine pour marquer leur territoire. La communication vocale leur est également très importante.

Reproduction

Le territoire du mâle chevauche celui de 2 ou 3 femelles. Au moment de la reproduction, ce dernier repère les femelles prêtes à s'accoupler grâce aux odeurs laissées dans leurs urines.

Sa reproduction est saisonale. L'oestrus arrive entre Juillet et octobre.

Quand la femelle se nourrit, elle laisse les petits seuls et cela dès le premier jour. Les petits sont indépendants de leur mère à six mois.

Conservation

Les loris sont menacés par la destruction et la dégradation des habitats forestiers et la vente.

Ils sont aussi tués pour leur viande et supposés avoir des propriétés médicinales. Le pelage, les yeux et d'autres parties du corps sont utilisés pour la médecine traditionnelle. Ils sont aussi capturés pour être vendus comme animaux de compagnie.

Il est protégé au Vietnam, au Cambodge et en Chine mais pas au Laos.

Gestion de l'espèce en captivité : EEP



Pygmy Slow loris

Distribution


The pygmy slow loris is most commonly found in semi-evergreen, secondary and mixed deciduous forests..

Behavior

The pygmy slow loris is nocturnal. Though it is active on cold, moonlit nights, it is generally active on dark nights regardless of temperature. In the wild it is normally encountered alone, or in small groups of two to four individuals. The pygmy slow loris produces an apocrine secretion on scent glands (brachial glands) near its elbow. This clear liquid, when mixed with its saliva, created a potent, noxious toxin. When startled, the slow loris licks its brachial glands and applies the secretion to its head. The oily secretion contains a complex mixture of volatile and semi-volatile components : one analysis indicated that over 200 chemicals were present. Vocalisations of the pygmy slow loris include a short whistle, mother-infant contact calls and a whistling sound produced during mating season. In addition to habitat destruction, the pygmy slow loris is seriously threatened by hunting and trade. Wild populations are being depleted due to their low reproduction rate.



**Forêts
tropicales
primaires et
secondaires**



EXSUDATIVORE
Il se nourrit la nuit
de gommés, de nectar,
de feuilles et
de bourgeons



Gestation : 6 mois
Naissance entre
janvier et mars
Nombre de petits : 1 à 2
Longévité : 17 ans

