

LE DHOLE [*Cuon alpinus*]

Classe : **Mammifères**

Ordre : **Carnivores**

Famille : **Canidés**



Statut de protection :

Convention de Washington : **Annexe II**

Règlement communautaire : **Annexe B**

Distribution géographique et habitat

On le trouve en Inde, de l'Asie du Sud-Est jusqu'en Indonésie, dans quelques régions de Russie, en Chine et en Corée. Il préfère les habitats forestiers et montagneux, mais dans les régions où il n'y a pas de forêts, comme au Tibet, il vit sur les hauts plateaux.

Description physique

Longueur : tête et corps, 76-112 cm | Queue, 30-50 cm

| Hauteur : 43-50 cm | Poids : jusqu'à 18 kg

Le dessus du pelage est rouge brillant. La nuque, le dessus de la tête et les épaules sont plus ternes et teintés de brun-jaune. Le dessous du pelage est plus clair que le dos, parfois blanc crème. La queue est touffue comme celle d'un renard, légèrement plus foncée que le corps. Le dhole a des marques foncées sous les yeux et sur le dessus du museau. Ses pattes sont assez courtes pour sa taille. La partie inférieure est blanche.

Reproduction

Dans les régions méridionales, le dhole n'a pas de saison de reproduction particulière. Mais plus au nord, les naissances ont lieu vers la fin de l'hiver, entre février et avril. La femelle choisit une tanière dans une grotte, une fissure de rocher ou un terrier qu'elle partage souvent avec d'autres femelles. Les jeunes naissent environ 60 jours après l'accouplement, complètement aveugles et recouverts d'une fourrure pelucheuse brun-jaune. À un mois, les jeunes dholes commencent à s'éloigner de leur mère et à mâcher de petits morceaux de viande. Six semaines plus tard, ils sont déjà indépendants.



Comportement

Une meute de dholes est formée soit de membres d'une même famille, soit de plusieurs familles réunies. Les dholes restent en contact avec la meute en lançant des appels à travers la forêt.

Alimentation

Les dholes préfèrent les ongulés. Le dhole est un chasseur infatigable. Aidé par son odorat très développé, il suit sa proie au petit trot sur plusieurs kilomètres pour l'épuiser, ce qui lui permet de la tuer assez facilement. Un dhole isolé peut vaincre un cervidé, mais il faut une meute bien organisée pour tuer les proies plus grandes comme le buffle.

Conservation

La disparition de ses proies fait du dhole un animal vulnérable sur une grande partie de ses aires de répartition. Il est chassé partout et également menacé par la destruction de son habitat.



DHOLE (ASIATIC WILD DOG)

Reproduction The Dhole doesn't have a particular reproduction season in southern areas. Further north, births occur towards the end of the winter usually between February and March. The female makes her den in a crack in the rock or a burrow that she often shares with others. When a female is on heat, the male pursues her whining incessantly until mating. The offspring are born 60 days later, completely blind and covered with fluffy brownish yellow fur. They put on weight very quickly and open their eyes two weeks later. The litter varies from 2 to 6. At one month old they start moving away from their mother and chewing small pieces of meat; 6 weeks later they are totally independent.

Conservation The disappearance of its prey makes it a very vulnerable animal on most of its territories. Other endangering causes are hunting and destruction of its natural habitat.



Forêts,
montagnes,
hauts plateaux



Carnivore :
ongulés, cervidés



Gestation : **60 jours**
Portée : **2 à 6 petits**
Maturité sexuelle : **3 ans**
Longévité : **jusqu'à 16 ans**