

L'HYDROPOTE

[*Hydropotes inermis*]

Classe : **Mammifères**

Ordre : **Artiodactyles**

Famille : **Cervidés**

Distribution géographique et habitat

On le trouve dans les vallées marécageuses et les plaines humides de Chine et de Corée. Quelques groupes vivent dans des zones plus accidentées.

Description physique

Hauteur au garrot : mâle, jusqu'à 55 cm ; femelle, moins de 50 cm | Poids : mâle, 11-14 kg ; femelle, 8-14 kg

La femelle est plus petite que le mâle et dépourvue de défenses. Les défenses sont formées par le développement des canines supérieures et elles peuvent atteindre 7 cm.

Reproduction

La période de reproduction se situe en automne et au début de l'hiver. Les mâles s'affrontent dans des combats pour la possession des femelles, en se frappant violemment avec leurs longues canines. Ces défenses peuvent infliger des blessures profondes mais rarement mortelles.

La femelle donne naissance à deux ou trois petits, parfois plus, en mai ou au début de juin. C'est une portée importante pour un cervidé. Très peu de temps après leur naissance, les faons sont déjà capables de se dresser et de se déplacer. Toutefois, ils passent leur première semaine dissimulés dans les hautes herbes et les roseaux, où leur mère vient les allaiter.

Comportement

L'hydropote vit paisiblement en petits groupes durant la plus grande partie de l'année, sauf à la période du rut où les mâles deviennent très agressifs. Chaque groupe se compose de mâles, de femelles et de jeunes d'âges divers.

L'acuité de sa vue, de son ouïe et de son odorat lui permet de détecter rapidement le danger. À la moindre alerte, il s'enfuit pour se réfugier au sein de la végétation.

Conservation

L'espèce ne paraît pas menacée dans l'ensemble de son aire de répartition, sans doute parce que sa petite taille lui évite d'être chassé pour sa chair et sa fourrure.



CHINESE WATER DEER

Reproduction Rutting takes place in autumn and early winter. Bucks fight over does, trying to land blows with their tusks. This can result in deep wounds which however are rarely fatal.

In early June the female gives birth to 1 to 3 or more fawns. a high number for Cervidae. Very soon after birth fawns are able to stand and move short distances. However for their first week they lie concealed in long grass and reeds where the doe comes to suckle them.

Conservation The species doesn't appear to be endangered in its natural habitat. Its relatively small size protects it from being hunted for meat and fur.



**Vallées
marécageuses,
plaines humides**



Herbivore.
Herbe, graines,
feuilles tendres,
jeunes pousses,
baies



Gestation : 6 mois
Portée : 2 à 3 petits
Maturité sexuelle : 5 à 8 mois
Longévité : 11 ans