

# LA PERRUCHE A COLLIER [ *Psittacula krameri* ]

Classe : **Oiseaux**  
Ordre : **Psittaciformes**  
Famille : **Psittacidés**



## Distribution géographique et habitat

Afrique Centrale à l'Ouganda, Sud de l'Asie, Inde, Sri Lanka. Introduite aux Moyen et Extrême Orient, en Europe. La perruche à collier est commune dans les zones cultivées, les milieux urbains, les parcs et les jardins, la campagne ouverte avec des arbres, les zones avec des palmiers, la forêt sèche et ouverte.

## Description physique

Taille : 38 à 42 cm | Envergure : 42 à 48 cm  
Poids : 95 à 140 g

La perruche à collier a un plumage vert jaune, une longue queue pointue, et un bec crochu, large et arrondi, de couleur rouge rose. Le mâle a une bavette noire, un collier noir et rose orangé étroit, qui part de la bavette, remonte autour des joues, pour s'achever en pointe fine de part et d'autre de la nuque. Les rémiges sont vert plus foncé au-dessus, et grises en dessous. La queue est vert bleuâtre sur les rectrices centrales, les sous caudales sont ocrées.

La femelle n'a ni bleu, ni rose, ni noir sur la tête, mais on peut distinguer un léger collier vert émeraude. Le juvénile ressemble à la femelle adulte, mais il a des tons plus jaunes dans le plumage, la queue plus courte, et le bec rose à bout clair.

## Reproduction

La parade nuptiale montre la femelle en train de gazouiller en roulant des yeux, et en faisant des demi-cercles avec la tête tout en agitant les ailes, pendant que le mâle se pavane. Ils se frottent le bec, et le mâle offre de la nourriture à la femelle en levant une patte. Les deux oiseaux à ces moments-là, émettent des sons doux. La perruche à collier est monogame.



Son nid est une cavité dans les arbres. Mais dans les villes, elles arrivent à nicher dans n'importe quelle cavité disponible en hauteur. La femelle dépose 3 à 4 œufs unis, de 30 x 24 mm. L'incubation est assurée par les deux parents, mais surtout par la femelle. C'est elle aussi qui élève les jeunes, occasionnellement assistée par le mâle. Les poussins obtiennent leur premier plumage à l'âge de 40/45 jours. Le plumage adulte apparaît à 18 mois, et complet à 32 mois.

## Comportement

La perruche à collier est un oiseau téméraire et opportuniste. Oiseau de volière lors de son introduction, elle a su s'adapter à toutes les situations, et vit en groupes plus ou moins denses dans la plupart des grandes cités.

## Conservation

Relativement commune, elle commence à s'installer dans les grands parcs citadins du monde.



## ROSE-RINGED PARAKEET

**Distribution and habitat** Central Africa, Uganda, Southern Asia, India and Sri Lanka

**Reproduction** During the courtship parade the female chirps while rolling her eyes, making half-circles with her head and flapping her wings. Meanwhile the male struts about. They rub beaks and the male offers the female some food while lifting his leg. Both birds utter soft sounds. The rose-ringed parakeet is monogamous.



Zones cultivées,  
milieux urbains,  
campagne,  
forêt sèche.



Grain, millet,  
riz, maïs, fruits,  
noix de pécan,  
bourgeons.



Incubation : 22 à 24 jours  
Ponte : 3 à 4 œufs  
Maturité sexuelle : 3 à 4 ans  
Longévité : 30 ans